



مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
King Faisal Specialist Hospital & Research Centre
مؤسسة عامة Gen. Org.



المصابين بنقص المناعة ووباء كوفيد-19

Immunocompromised Patients
during COVID-19 Outbreak



مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
ص.ب 3354 الرياض 11211
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 114647272
www.kfshrc.edu.sa

CSR 20-016

٢٠٢٠ - ١٤٤١ م

• عدم إيقاف أو تغيير أيّاً من العلاجات الموصوفة لك، بما في ذلك أي مضادات حيوية أو أدوية أخرى تستخدم للوقاية من العدوى، أو أدوية تثبيط المناعة، دون مناقشة ذلك مع الطبيب المختص.



• أهمية الالتزام بحضور جميع المواعيد التي تتطلب الذهاب إلى المستشفى سواء لمقابلة الطبيب أو لأخذ العلاجات الوريدية في منطقة العلاج المخصصة لذلك.



• ينصح بتأجيل المواعيد الروتينية لمن استكمل خطة العلاج بعد موافقة الطبيب المشرف والتنسيق المسبق معه.



• استخدام وتفعيل منصات الاستشارات الطبية عن بعد (كالفيديو والهاتف وغيرها) متى ما أمكن ذلك، وذلك بعد مناقشة هذا الخيار مع الطبيب المعالج، بهدف تقليل فرص مخالطة الغير والتعرض للعدوى بأقل قدر ممكن. وفي نفس السياق قد يتم أخذ العينات المخبرية خلال التواجد في المنزل عوضاً عن الذهاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات المخبرية.



• التواصل المباشر مع الطبيب المعالج في حال ظهور أي أعراض تنفسية كالحمى والسعال وصعوبة وضيق في التنفس، مع الالتزام بالتوجيهات الصادرة من مقدمي الرعاية الصحية فيما يخص تعليمات الحضور إلى المستشفى.



المصدر:

<https://www.allergy.org.au/patients/immunodeficiencies/covid-19-and-immunodeficiency>

يُعتبر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من مجموعة

الفيروسات التاجية المسببة لأمراض الجهاز التنفسى، بما في ذلك الأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد وملازمة الالتهاب التنفسى الحاد (سارس) وملازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

تظهر على المصاب بهذا الفيروس أعراض تراوح ما بين المتوسطة والشديدة. كما أن هناك من يصاب بهذا الفيروس دون ظهور أية أعراض عليه.

تشمل أعراض الإصابة الأكثر شيوعاً: السعال والحمى وضيق أو صعوبة في التنفس، في حين قد يشكو البعض من وجود احتقان وسيلان في الأنف أو التهاب في الحلق أو إسهال.

ينتقل الفيروس للإنسان عن طريق استنشاق الرذاذ المتطاير نتيجة لسعال أو العطاس، أو من خلال ملامسة اليدين لأسطح ملوثة بالرذاذ ومن ثم ملامسة كل من العينين أو الأنف أو الفم.

ما الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل المرضى الذين يعانون من نقص في المناعة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؟

من المهم معرفة أن المرضى الذين يعانون من نقص المناعة الشديد أو من يتناولون الأدوية المثبتة للمناعة بما في ذلك الخاضعين لزراعة نخاع العظام (الخلايا الجذعية)، هم أكثر عرضة للإصابة بجميع أنواع العدوى بسبب وهن جهازهم المناعي. وقد تسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ازدياد شدة الأعراض لديهم وبالتالي خطورة المضاعفات الجانبية.

وعليه سيقوم مقدمي الرعاية الصحية بتقديم التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية بهدف تجنب الإصابة بالعدوى بشكل عام، وتشمل ما يلي:

- الالتزام بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة السعودية.


- التوقف عن إلقاء التحية على الآخرين بالمصافحة أو العناق أو التقبيل.




- تنظيف وتطهير الأسطح بشكل دوري باستخدام المعقمات والمنظفات الموصى بها، خصوصاً تلك التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل الطاولات والكراسي ومقابض الأبواب ومجوسيات الإضاءة وأجهزة التحكم عن بعد والم المقابض والمكاتب والمرحاض وغيرها.



- ارتداء الكمامة لتغطية الأنف والفم عند الخروج من المنزل، ليس فقط لحماية مرتدتها من الإصابة بالفيروس بل أيضاً لحماية الآخرين من التقاط العدوى التنفسية من المصابين بالفيروس وخصوصاً أولئك الذين ليست لديهم أية أعراض.



- ينصح بارتداء الكمامات الطبية في الحالات التالية:
 - خلال حضورك لمواقع المستشفى.
 - إذا كنت تعاني من أعراض تنفسية كالسعال أو العطاس.




- الالتزام بمفهوم الحجر الصحي، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.




- التأكد من توفر الأدوية الخاصة بك، وكذلك من وجود الوصفات الطبية لمدة لا تقل عن شهر واحد قبل نفاد ما لديك من علاج.



- اتباع الإرشادات والتعليمات من قبل الطبيب المعالج.



- تنظيف اليدين بشكل دوري باستخدام الماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وفي حال عدم توفرهما يتم الاستعاضة بمطهر كحولي يحتوى على 60٪ من الكحول على الأقل.




- تجنب ملامسة اليدين لكل من العينين والأنف والفم قدر المستطاع.



- التقيد بآداب السعال والعطاس وذلك باستخدام المنديل لتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس والتخلص منها مباشرة في سلة مهملات مغلقة مع الحفاظ على غسل اليدين. وينصح باستخدام المرفق عن طريق ثني الذراع في حال عدم توفر المنديل.



- الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وذلك بالإبقاء على مسافة لا تقل عن متراً واحداً بينك وبين الآخرين خصوصاً أولئك الذين يظهرون أعراضاً مرضية في الجهاز التنفسى.



- تجنب أماكن الزحام قدر الإمكان.



- تجنب التجمعات الصغيرة كالمناسبات العائلية وغيرها.

